



Simulation

Réalisée par vincent buard le 23/12/2013

Rotation	Colza/Blé/Maïs/Blé												
Adventices	Folle Avoine, Ray-grass, Vulpin												
Colza	COLZAMID , Présemis COLZOR TRIO , Prélevée STRATOS ULTRA , Postlevée 8 F Risque lié aux pratiques herbicides sur la culture : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Folle Avoine :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Ray-grass :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Vulpin :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> </table>	Folle Avoine :	Faible		Fort	Ray-grass :	Faible		Fort	Vulpin :	Faible		Fort
Folle Avoine :	Faible		Fort										
Ray-grass :	Faible		Fort										
Vulpin :	Faible		Fort										
Blé	ABAK , plein tallage ALLIE DUO SX , plein tallage Risque lié aux pratiques herbicides sur la culture : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Folle Avoine :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Ray-grass :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Vulpin :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> </table>	Folle Avoine :	Faible		Fort	Ray-grass :	Faible		Fort	Vulpin :	Faible		Fort
Folle Avoine :	Faible		Fort										
Ray-grass :	Faible		Fort										
Vulpin :	Faible		Fort										
Maïs	ISARD , Prélevée CAMBIO , Post-levée max adv 2-3F CONQUERANT , Post-levée max adv 2-3F Risque lié aux pratiques herbicides sur la culture : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Folle Avoine :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Ray-grass :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Vulpin :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> </table>	Folle Avoine :	Faible		Fort	Ray-grass :	Faible		Fort	Vulpin :	Faible		Fort
Folle Avoine :	Faible		Fort										
Ray-grass :	Faible		Fort										
Vulpin :	Faible		Fort										
Blé	HERBAFLEX , 2 feuilles DEFI , 2 feuilles KART , 1- 2 nœuds Risque lié aux pratiques herbicides sur la culture : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Folle Avoine :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Ray-grass :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> <tr> <td>Vulpin :</td> <td>Faible</td> <td></td> <td>Fort</td> </tr> </table>	Folle Avoine :	Faible		Fort	Ray-grass :	Faible		Fort	Vulpin :	Faible		Fort
Folle Avoine :	Faible		Fort										
Ray-grass :	Faible		Fort										
Vulpin :	Faible		Fort										
Agronomie	Faux-semis (été/automne) : faux-semis systématiques ou quasi systématiques Déchaumages post-récolte : déchaumages répétés, montées à graines impossibles Fréquence de labour : labour tous les ans Date de semis de la céréale d'hiver : date de semis recommandée Date de semis de la culture d'été (maïs ou tournesol) : date de semis recommandée Désherbage mécanique en culture : pas de désherbage mécanique												
Risque d'apparition de résistances sur la rotation													

Folle Avoine



⚠ Efficacité insuffisante ou nulle sur maïs.

Ray-grass



Vulpin



Impact des pratiques agronomiques sur le risque

Folle Avoine



Ray-grass



Vulpin

