

Efficacité des méthodes courantes

L'Organisation Mondiale de la Santé, dans le document intitulé Critères de recevabilité pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives (3e édition, 2005), indique les statistiques suivantes pour l'efficacité des méthodes contraceptives :

Méthode	Échec avec utilisation correcte	Échec en emploi typique
Aucune méthode	85 %	85 %
<u>Pilule</u>	0,3%	8%
<u>Stérilet au cuivre</u>	0,6 %	0,8 %
<u>Stérilet hormonal</u>	0,1 %	0,1 %
<u>Préservatif masculin</u>	2%	15%
<u>Coït interrompu</u>	4%	27%
<u>Préservatif féminin</u>	5%	21%
<u>Anneau vaginal</u>	0,3%	8%
<u>Timbre contraceptif</u>	0,3%	8%
<u>Diaphragme</u>	6%	16%
<u>Cape cervicale</u>	9% / 26% (nullipare / ayant un enfant)	16% / 32% (nullipare / ayant un enfant)
<u>Éponge</u>	9% / 20% (nullipare / ayant un enfant)	16% / 32% (nullipare / ayant un enfant)
<u>Spermicides</u>	18%	29%
<u>Progestatifs injectables</u>	0,3%	3%
<u>Stérilisation masculine (vasectomie)</u>	0,1%	0,15%
<u>Stérilisation féminine (ligature des trompes)</u>	0,5%	0,5%
<u>Méthode du calendrier</u>	9%	
<u>Méthode de la température</u>	jusqu'à 25%	
<u>Méthode symptothermique</u>	2%	