

Produit scalaire dans le plan

Remarques

I. Produit scalaire de deux vecteurs


Définition:

Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan et A, B et C trois points du plan tels que : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.


Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) .

Le **produit scalaire** des deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} , noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le **nombre réel** défini comme suit :

- Si \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AH} ont même sens, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH$.
- Si \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AH} ont des sens contraires, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -AB \times AH$.



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -AB \times AH$$




$$\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH$$

Application ①:

Soit $ABCD$ un trapèze isocèle tel que :

$AB = 6$ et $CD = 5$ et soient I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$. (voir la figure).



Calculer les produits scalaires suivants :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC'}$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$
- $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IJ}$
- $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{ID}$

Propriété: Formule trigonométrique du produit scalaire

- Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan, on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$.
- Soient A, B et C trois points du plan, on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

Application ②:

1) Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les deux cas suivants :

① $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$.

② $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = \frac{2}{\sqrt{2}}$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.

2) Soit ABC un triangle équilatéral tel que $AB = 4$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$.

3) Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $BC = 6$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

4) Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan. Déterminer les mesures possibles de l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{v})$ sachant que : $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2\sqrt{6}$.

Pr. Latrach ABDELKBIR

✍ Exercice :

ABC un triangle isocèle en A tels que $AB = 3$ et $BC = 3\sqrt{3}$.

1) Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

2) En déduire \widehat{ACB} et \widehat{CAB} .

II. Propriétés du produit scalaire :

✍ Propriété :

Soient \vec{u}, \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs du plan et k un réel. On a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$ (\vec{u}^2 est appelé *carré scalaire* de \vec{u})

✍ Application ③ :

Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan tels que : $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, \vec{u}^2 , \vec{v}^2 et $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \frac{3}{2}\vec{v})$.

✍ Propriété :

Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan. On a :

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(-\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

✍ Application ④ :

1) Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs tels que : $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Calculer : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $(2\vec{u} - 3\vec{v})^2$.

2) Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs tels que : $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 2$, et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$.

Calculer : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

✍ Propriété :

Soient A, B et C trois points du plan, on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$.

○ Démonstration :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2}(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)\end{aligned}$$

Application ⑤:

1) Soient A, B et C trois points du plan tels que : $AB = 1, AC = \sqrt{3}$ et $BC = \sqrt{2}$.

Calculer : $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$ et $\overline{BC} \cdot \overline{AB}$.

2) Soit ABC un triangle rectangle en A . Calculer : $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

Propriété:

Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs du plan.

\vec{u} et \vec{v} sont **orthogonaux**, et on écrit $\vec{u} \perp \vec{v}$, si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Application ⑥:

Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs orthogonaux du plan tels que : $\|\vec{u}\| = 4$, et $\|\vec{v}\| = 5$.

Déterminer le réel m sachant que : $(m\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 13$.

Exercice :

ABC est un triangle $AB = 1, AC = \sqrt{2}$ et $\cos(\hat{A}) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

1) Calculer $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

2) Considérons D un point du plan défini par : $\overline{AD} = \frac{1}{3}(\overline{AB} + 2\overline{AC})$.

a)- Calculer $\overline{AB} \cdot \overline{AD}$.

b)- Conclure.

III. Théorème d'Al-Kashi

Soit ABC un triangle. On a : $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$.

Donc : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

Par conséquent : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

Théorème : Théorème d'Al-Kashi

Soit ABC un triangle. On a :

- $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\hat{A})$
- $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \times BC \times \cos(\hat{C})$
- $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \times \cos(\hat{B})$

Application ⑦:

1) ABC est un triangle tel que $AB = 3, AC = 5$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{4}$. Calculer BC .

2) MNP est un triangle tel que $MN = \sqrt{3}, NP = 2$ et $\hat{N} = \frac{5\pi}{6}$. Calculer MP .

IV. Théorème de la médiane

Soit ABM un triangle et I le milieu de $[AB]$.

Calculons $MA^2 + MB^2$ en fonction de MI et AB .

$$MA^2 + MB^2 = \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = (\overline{MI} + \overline{IA})^2 + (\overline{MI} + \overline{IB})^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

Théorème : **théorème de la médiane**

Soit ABM un triangle et I le milieu de $[AB]$. On a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$.

Application ⑩:

ABM un triangle et I, J et K les milieux respectifs de $[AB]$, $[AM]$ et $[BM]$.

Sachant que : $AB = 4$, $AM = 3$ et $BM = 4$, calculer les distances MI , AK et BJ .

Exercice :

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $\widehat{BAD} = \frac{\pi}{3}$ et $AD = 4$ et $CD = 6$ et soit O le milieu du segment $[AB]$.

1) Calculer les distances BD et AC .

2) Montrer que pour tout point M du plan que $MA^2 + MB^2 = 2MO^2 + 18$.

3) En déduire l'ensemble des points M du plan tel que $MA^2 + MB^2 = 24$.

V. Relations métriques dans un triangle rectangle

Propriété:

Soient ABC un triangle et H le projeté orthogonal de A sur (BC) et I le milieu de $[BC]$.

ABC est rectangle en A si et seulement si l'une des relations suivantes est vérifiée :

✓ $BC^2 = AC^2 + AB^2$.

✓ $AB^2 = BH \times BC$.

✓ $AH^2 = HB \times HC$.

✓ $AI = \frac{1}{2}BC$.

Application ⑪:

Soient ABC un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur (BC) et $AB=3$, $AC=4$.

Calculer les longueurs BC , HC , HB et AH

Exercice de synthèse :

Soit ABC un triangle tel que : $AB = 3$ et $AC = 1$ et $\cos(BAC) = \frac{-1}{3}$

1) Vérifier que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$.

2) Calculer la distance BC .

3) Soient I et J les milieux respectifs de $[BC]$ et $[AC]$.

a/- Calculer AI et BJ .

b/- Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}$.

4) Soit E un point du plan tel que : $\overrightarrow{AE} = \frac{4}{9}\overrightarrow{AB}$.

a/- Ecrire le vecteur \overrightarrow{IE} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .

b/- Montrer que les droites (AB) et (IE) sont perpendiculaires.