

تمرين 01:

- نحدد طبيعة كل نوع من أنواع الأكياس الأسكية الستة ضمن الجدول:

الأنماط	1	2	3	4	5	6
	a	A	a	a	A	A
	a	A	a	a	A	A
	a	A	A	A	a	a
	a	A	A	A	a	a
	A	a	a	A	a	A
	A	a	a	A	a	A
	A	a	A	a	A	a
	A	a	A	a	A	a
عدد الأكياس الأسكية	96	109	9	12	6	8
طبيعة الأكياس الأسكية	أبوية		عبورية			

1 - تحديد عدد الجينات المتحركة في صفة علامة الجنس:

- لتحديد عدد الجينات ندرس انعزال الصفات داخل الأكياس الأسكية ونحسب النسبة:

$$1:1 = 4:4 = \text{عدد الجراثيم الحاملة لصفة } a : \text{عدد الجراثيم الحاملة لصفة } A$$

وبالتالي هناك جين واحد يحكم صفة علامة الجنس بأليليه (A, a).

2- التمثيل الكروموسومي (واجب منزلي)

3 - دراسة ارتباط الجين بالسنترومير:

- يكون الجين A مرتبطا بالسنترومير إذا كانت النسبة المئوية للأكياس العبورية المدروسة أقل من النسبة المئوية للأكياس العبورية النظرية القصوى (66,67%).

$$\begin{aligned} \text{النسبة المئوية للأكياس العبورية} &= \frac{\text{عدد الأكياس العبورية}}{\text{عدد الأكياس الكلية}} \times 100 = \frac{09+12+06+08}{240} \times 100 \\ &= 14,58\% \end{aligned}$$

- % للأكياس العبورية = 14,58، وهي أقل من 66,67، وبالتالي فإن الجين A مرتبط بالسنترومير.

- استخراج علاقة حساب المسافة الوراثية d:

$$d = \% RT = \% (\text{الأنماط العبورية}) = \% (\text{الجراثيم العبورية})$$


$$= \frac{\text{عدد الجراثيم العبورية}}{\text{عدد الجراثيم الكلية}} \times 100$$

$$= \frac{4}{8} \times 100 = \frac{1}{2} \% (\text{الأكياس العبورية})$$

- حساب المسافة الوراثية d:

$$d = \frac{1}{2} \% (14,58) = 7,29 \text{ cM}$$

ويعبر عنها على الكروموسوم كالتالي:



4 - حساب عدد أكياس كل نمط في حالة d=20 cM :

- من خلال العلاقة : d = % RT

- نستنتج نسبة التراكيب (الجراثيم) العبورية = 20%، وهي موزعة بالتساوي عبر أنواع الأكياس الأسكية الأربعة: 3، 4، 5، 6.

- أما نسبة التراكيب (الجراثيم) الأبوية = 80%، وهي موزعة بالتساوي عبر النوعين: 1 و 2.

- وعليه يمكن الإجابة على السؤال من خلال الجدول الموالي:

أنماط الأكياس الأسكية	1	2	3	4	5	6
الطبيعة من حيث كونها : أبوية أو عبورية	أبوية		عبورية			
النسبة المئوية	80		20			
عدد الأكياس الأسكية	40	40	5	5	5	5
العدد الإجمالي	96	96	12	12	12	12
	240					

تمرين 02:

1 - تحديد عدد الجينات المتحركة في لون الأبواغ:

- لتحديد عدد الجينات ندرس انعزال الصفات داخل الأكياس الأسكية ونحسب النسبة:

$$1 = 4 : 4 = \text{عدد الجراثيم البيضاء} : \text{عدد الجراثيم السوداء}$$

- وبالتالي هناك جين واحد B يحكم صفة لون الأبواغ بأليليه (b⁺, b).

2 - دراسة ارتباط الجين بالسنترومير:

- يكون الجين B مرتبطا بالسنترومير إذا كانت النسبة المئوية للأكياس العبورية المدروسة أقل من النسبة المئوية للأكياس العبورية النظرية القصوى (66,67%).

$$\text{النسبة المئوية للأكياس العبورية} = \frac{\text{عدد الأكياس العبورية}}{\text{عدد الأكياس الكلية}} \times 100 = \frac{300}{1000} \times 100 = 30\%$$

- % للأكياس العبورية = 30%، وهي أقل من 66,67%، وبالتالي فإن الجين B مرتبط بالسنترومير.

3 - حساب المسافة الوراثية d:

$$d = \frac{1}{2} \% (\text{الأكياس العبورية}) = \frac{1}{2} (30) = 15 \text{ cM}$$

4- إثبات المعادلة (سبق إثباتها في التمرين 1)

تمرين 03:

- لدينا التركيب الوراثي للسلالتين الأبويتين: (try⁺, his⁻) و (try⁻, his⁺).

1- تسمية أنواع الأكياس الأسكية:

الأنماط	1	2	3
الرباعيات	try ⁺ , his ⁻ try ⁺ , his ⁻ try ⁻ , his ⁺ try ⁻ , his ⁺	try ⁻ , his ⁺ try ⁻ , his ⁻ try ⁺ , his ⁻ try ⁺ , his ⁺	try ⁻ , his ⁻ try ⁺ , his ⁺ try ⁻ , his ⁻ try ⁺ , his ⁺
عدد الأكياس الأسكية	540	300	539
التسمية	نمط ثنائي أبوي	نمط رباعي	نمط ثنائي غي أبوي
مصطلح التسمية	Parental Ditype (PD)	Tetratype (TT)	Non Parental Ditype (NPD)

2 - تحديد عدد الجينات المتحركة في التهجين:

- لمعرفة عدد الجينات ندرس انعزال نواتج الانقسام الميوزي داخل الكيس الأسكي الواحد، وذلك بالنسبة لكل صفة على حدة، فنجد:

صفة القدرة أو عدم القدرة على تخليق his	صفة القدرة أو عدم القدرة على تخليق try
$his^+ : his^-$ $2/4 : 2/4$ $2 : 2$ $1 : 1$	$try^+ : try^-$ $2/4 : 2/4$ $2 : 2$ $1 : 1$
هناك جين واحد بآليليه (his^+ , his^-) يتحكم في هذه الصفة	هناك جين واحد بآليليه (try^+ , try^-) يتحكم في هذه الصفة
و مجملنا نقول أن هناك جينان (أليلان لكل جين) يتحكمان في هذا التهجين.	

3 - دراسة ارتباط الجينين:

- لمعرفة إذا ما كان الجينان مرتبطان أم مستقلان نقارن بين عدد الأكياس الأبوية (PD) وعدد الأكياس غير الأبوية (NPD)، فإذا كانت (PD) < (NPD) فهناك ارتباط بين الجينين، أي أنهما موجودان على نفس الكروموسوم. عدا ذلك فهناك استقلال، وفي مثالنا نجد الآتي:

PD = 540 و NPD = 539، أي PD ≈ NPD، وبالتالي فالجينان مستقلان.

تمرين 04:

- لدينا التركيب الوراثي للسلالتين الأبويتين: (A, met^+) و (a, met^-).

1 - تحديد عدد الجينات المتحركة في التهجين:

- لمعرفة عدد الجينات ندرس انعزال نواتج الانقسام الميوزي داخل الكيس الأسكي الواحد، وذلك بالنسبة لكل صفة على حدة، فنجد:

صفة علامة الجنس A	صفة القدرة أو عدم القدرة على تخليق met
$A : a$ $4/8 : 4/8$ $4 : 4$ $1 : 1$	$met^+ : met^-$ $4/8 : 4/8$ $4 : 4$ $1 : 1$
هناك جين واحد بآليليه (A, a) يتحكم في هذه الصفة	هناك جين واحد بآليليه (met^+ , met^-) يتحكم في هذه الصفة

- وبالتالي هناك جينان (أليلان لكل جين) يتحكمان في هذا التهجين.

2 - دراسة الارتباط:

- نقارن بين عدد الأكياس الأبوية (PD) وعدد الأكياس غير الأبوية (NPD)، وفي مثالنا نجد الآتي:

PD = 140 و NPD = 04، أي PD >> NPD، وبالتالي فالجينان مرتبطان.

3 -

- استخراج علاقة حساب المسافة الوراثية d:

$$d = \% RT = \% (\text{الأنماط العبورية}) = \% (\text{الجراثيم العبورية}) = \frac{\text{عدد الجراثيم العبورية}}{\text{عدد الجراثيم الكلية}} \times 100$$

$$= \frac{8(NPD) + 4(TT)}{8(PD + NPD + TT)} \times 100 = \frac{(NPD) + \frac{1}{2}(TT)}{(PD + NPD + TT)} \times 100$$

- حساب المسافة الوراثية d:

$$d = \frac{(NPD) + \frac{1}{2}(TT)}{(PD + NPD + TT)} \times 100 = \frac{(04) + \frac{1}{2}(68)}{(140 + 04 + 68)} \times 100 = 17,92 \text{ cM}$$

الأنماط	1	2	3
	2 a, met ⁻ 2 a, met ⁻ 2 A, met ⁺ 2 A, met ⁺	2 a, met ⁻ 2 a, met ⁺ , 2 A, met ⁺ 2 A, met ⁻	2 a, met ⁺ 2 a, met ⁺ 2 A, met ⁻ 2 A, met ⁻
عدد الأكياس الأسكية	140	68	04

4- التمثيل الكروموسومي (واجب منزلي)

تمرين 05:

- لدينا التركيب الوراثي للسلالتين الأبويتين: (arg⁻, pab⁺) و (arg⁺, pab⁻)، (Pab : Para-aminobenzoic acid).

1- تسمية أنماط الأكياس:

الأنماط	1	2	3
الرباعيات	arg ⁻ , pab ⁺ arg ⁻ , pab ⁺ arg ⁺ , pab ⁻ arg ⁺ , pab ⁻	arg ⁻ , pab ⁻ arg ⁻ , pab ⁻ arg ⁺ , pab ⁺ arg ⁺ , pab ⁺	arg ⁻ , pab ⁺ arg ⁻ , pab ⁻ arg ⁺ , pab ⁺ arg ⁺ , pab ⁻
عدد الأكياس الأسكية	119	01	71
التسمية	نمط ثنائي أبوي	نمط ثنائي غير أبوي	نمط رباعي
مصطلح التسمية	Parental Ditype (PD)	Non Parental Ditype (NPD)	Tetratype (TT)

2 - تحديد عدد الجينات المتحركة في التهجين:

- لمعرفة عدد الجينات ندرس انعزال نواتج الانقسام الميوزي داخل الكيس الأسكي الواحد، وذلك بالنسبة لكل صفة على حدة، فنجد:

صفة القدرة أو عدم القدرة على تخليق pab	صفة القدرة أو عدم القدرة على تخليق arg
pab ⁺ : pab ⁻ 2/4 : 2/4 2 : 2 1 : 1	arg ⁺ : arg ⁻ 2/4 : 2/4 2 : 2 1 : 1
هناك جين واحد بأليليه (pab ⁻ , pab ⁺) يتحكم في هذه الصفة	هناك جين واحد بأليليه (arg ⁺ , arg ⁻) يتحكم في هذه الصفة

- وبالتالي هناك جينان (أليلان لكل جين) يتحكمان في هذا التهجين.

3 - دراسة الارتباط:

- نقارن بين عدد الأكياس الأبوية (PD) وعدد الأكياس غير الأبوية (NPD)، وفي مثالنا نجد الآتي:
PD = 119، و NPD = 01، أي PD >> NPD، وبالتالي فالجينان مرتبطان.

4 - حساب المسافة الوراثية بين الجينين d:

$$d = \frac{(NPD) + \frac{1}{2}(TT)}{(PD + NPD + TT)} \times 100 = \frac{(01) + \frac{1}{2}(71)}{(119 + 01 + 71)} \times 100 = 19,11 \text{ cM}$$