Examen Final en Mathématiques 1 (Session Principale)
17 Janvier 2022 (11h.30 → 13h.30)

Aucun document n'est autorisé. Seules les calculatrices non-programmables et non graphiques sont autorisées. Il sera tenu compte de la rigueur et de la clarté de la rédaction. Cet énoncé comporte 3 exercices indépendants.

► Exercice 1 : (5 points)

(1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 2.$$

- (a) Chercher tous les points critiques de f sur $\mathbb{R}$.
 (b) Déterminer tous les extremums locaux de f sur $\mathbb{R}$.
 (2) Calculer avec justification les valeurs suivantes : $\min_{x \in [0,2]} f(x)$ et $\max_{x \in [0,2]} f(x)$.
 (3) Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \ln(1-x) \sin x}{e^{x^2} - 1}$$

(4) On considère la fonction de deux variables suivante :

$$g(x, y) = x^2y + x^2 - 2x - y + 1.$$

Chercher les extremums locaux de la fonction g sous la contrainte $y - x = -1$ par la méthode de substitution.

► Exercice 2 : (7 points)

On considère les fonctions de deux variables suivantes :

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} - 2xy - y^2 + \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (1) (a) Déterminer $\nabla f(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 (b) Montrer que f possède exactement deux points critiques sur $\mathbb{R}^2$ que l'on déterminera.
 (2) (a) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer $\mathcal{H}_f(x, y)$ la matrice hessienne de f au point (x, y) .
 (b) La fonction f admet-elle en $(0, 0)$ un maximum local ? justifier votre réponse.
 (3) Soit $\mathcal{P}$ le plan tangent à la surface représentative $\mathcal{S}_f$ de f au point $A(1, -2, f(1, -2))$.
 (a) Déterminer l'équation du plan $\mathcal{P}$.
 (b) Préciser la position relative de $\mathcal{S}_f$ par rapport à $\mathcal{P}$ au voisinage du point $(1, -2)$.
 (4) Montrer que l'équation $f(x, y) = 1$ permet de définir une fonction implicite φ au voisinage du point $(1, -2)$ vérifiant $\varphi(1) = -2$ puis calculer

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x) + 2}{x - 1}.$$

(5) Montrer que la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

► **Exercice 3 : (8 points)**

Soient les fonctions réelles suivantes :

$$f(x) = \ln(1 + e^x) \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{\ln(1 + e^x) - \ln 2}{x}.$$

- (1) Montrer que $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ puis calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
(2) (a) Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
(b) Dédire que pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, on a

$$1 + e^{\frac{a+b}{2}} \leq \sqrt{(1 + e^a)(1 + e^b)}.$$

- (3) (a) Donner le développement limité en 0 à l'ordre 2 de la fonction $x \mapsto \ln(2 + x)$.
(b) Dédire que le développement limité en 0 à l'ordre 2 de la fonction f est donné par :

$$f(x) = \ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

- (c) Soit T_0 la tangente à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f au point d'abscisse $x = 0$. Déterminer l'équation de T_0 puis préciser la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T_0 au voisinage de 0.
(4) (a) Montrer que g est prolongeable par continuité en 0 puis déterminer h la fonction prolongement par continuité de g en 0.
(b) Étudier la dérivabilité de h sur D_h où D_h désigne le domaine de définition de h .

❀ ❀ Bon travail ❀ ❀

Corrige détaillé de l'examen final
en mathématiques 1 préparé par Mr. Kais Feki
2021-2022

Ex 1 1) $f(x) = x^3 - 3x + 2$

a) $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. De plus $\forall x \in \mathbb{R}$ on a

$$f'(x) = 3x^2 - 3. \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Donc les points critiques de f sont 1 et -1

b) $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $f''(x) = 6x$

•) $f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow f$ admet en $x = 1$ un minimum local

••) $f''(-1) = -6 < 0 \Rightarrow f$ admet en $x = -1$ un maximum local

e)

x	0	1	2
$f(x)$	2	0	4

$$\Rightarrow \max_{x \in [0,2]} f(x) = 4 \quad \text{et} \quad \min_{x \in [0,2]} f(x) = 0$$

3) $\frac{f(x) \ln(1-x) \sin x}{e^{x^2} - 1} \sim_0 \frac{2x(-x) \cdot x}{x^2} = -\frac{2x^2}{x^2} = -2$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \ln(1-x) \sin x}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} -2 = -2$$

$$4) g(x,y) = x^2 y + x^2 - 2x - y + 1$$

les extremums locaux de f sous la contrainte $y-x=-1$?

$$y-x=-1 \Leftrightarrow \boxed{y=x-1} \textcircled{\#}$$

$$\begin{aligned} g(x,y) &= g(x, x-1) = x^2(x-1) + x^2 - 2x - (x-1) + 1 \\ &= x^3 - x^2 + x^2 - 2x - x + 1 + 1 \\ &= x^3 - 3x + 2 = f(x) \end{aligned}$$

Or d'après 1)b) f admet en $x=1$ un minimum local et en $x=-1$ un maximum local.

$$\begin{aligned} \text{Or d'après } \textcircled{\#} \text{ on a } x=1 &\Rightarrow y=0 \\ x=-1 &\Rightarrow y=-2 \end{aligned}$$

D'où g admet en $(1,0)$ un minimum local sous la contrainte $y-x=-1$ et en $(-1,-2)$ un maximum local sous la contrainte $y-x=-1$.

Ex 2 $f(x,y) = \frac{x^3}{3} - 2xy - y^2 + \frac{2}{3}$

1)a) $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. De plus $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\nabla f(x,y) = \left(\underbrace{x^2 - 2y}_{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)} ; \underbrace{-2x - 2y}_{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)} \right)$$

b) $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ est un point critique de $f \Leftrightarrow \nabla f(x,y) = (0,0)$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2y ; -2x - 2y) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2y = 0 \\ -2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2y = 0 \textcircled{1} \\ y = -x \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ dans } \textcircled{1} \text{ donne } x^2 - 2x(-x) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x+2) = 0$$

$$\Rightarrow x=0 \text{ ou } x=-2$$

$$\text{or } \textcircled{2} \text{ donne } x=0 \Rightarrow y=0$$

$$x=-2 \Rightarrow y=2$$

$\Rightarrow (0,0)$ et $(-2,2)$ sont les points critiques de f

$$\textcircled{2} \text{ a) on a } \nabla f(x,y) = (x^2 - 2y; -2x - 2y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{b) } H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(H_f(0,0)) = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

$\Rightarrow f$ admet en $(0,0)$ un point selle

$\Rightarrow f$ n'admet pas en $(0,0)$ un maximum local

3) a) L'équation du plan tangent à S_f au point

$$A(1,-2, f(1,-2)) \text{ est } (P): z = \nabla f(1,-2) \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y+2 \end{pmatrix} + f(1,-2)$$

$$\text{or } \nabla f(x,y) = (x^2 - 2y; -2x - 2y)$$

$$\Rightarrow \nabla f(1,-2) = (5; 2) \quad \text{or } f(1,-2) = \frac{1}{3} + 4 - 4 + \frac{2}{3} = 1$$

$$\Rightarrow P: z = (5, 2) \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y+2 \end{pmatrix} + 1 = 5(x-1) + 2(y+2) + 1 = 5x + 2y - 5 + 4 + 1$$

$$\Rightarrow \boxed{P: z = 5x + 2y}$$

③

$$b) \det(Hg(1, -2)) = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 4 = -8 < 0$$

$\Rightarrow \mathcal{F}$ traverse S_g au voisinage du point $(1, -2)$

$$4) f(x, y) = 1 \Leftrightarrow \frac{x^3}{3} - 2xy - y^2 + \frac{2}{3} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3}{3} - 2xy - y^2 - \frac{1}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow h(x, y) = 0$$

$$\text{on } h(x, y) = \frac{x^3}{3} - 2xy - y^2 - \frac{1}{3}$$

$$\bullet h(1, -2) = \frac{1}{3} + 4 - 4 - \frac{1}{3} = 0$$

$$\bullet h \in C^1(\mathbb{R}^2) \text{ avec } (1, -2) \in \mathbb{R}^2$$

$$\bullet \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = -2x - 2y \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial y}(1, -2) = -2 + 4 = 2 \neq 0$$

d'après le théorème des fonctions implicites

il existe I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant 1

et $\varphi: I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur I

tel que $\varphi(1) = -2$ et $h(x, \varphi(x)) = 0 \forall x \in I$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x) + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x - 1} = \varphi'(1)$$

$$\text{or } \varphi'(1) = \frac{-\frac{\partial h}{\partial x}(1, -2)}{\frac{\partial h}{\partial y}(1, -2)} = \frac{-\frac{\partial h}{\partial x}(1, -2)}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$\text{(car } \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = x^2 - 2y \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial x}(1, -2) = 5)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x) + 2}{x - 1} = \frac{-5}{2}$$

5) $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ on a

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \frac{2xy^2(x^2+y^2) - x^2y^2 \cdot (2x)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{2x^3y^2 + 2xy^4 - 2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

D'autre part

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x,0) - g(0,0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0 < \infty$$

$$\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) = 0$$

$$\text{Donc } \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Il est clair que $\frac{\partial g}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

continuité de $\frac{\partial g}{\partial x}$ en $(0,0)$

on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ ($r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$)

$(x,y) \rightarrow (0,0) \Leftrightarrow r \rightarrow 0$; $x^2 + y^2 = r^2$

$$\left| \frac{\partial g}{\partial x}(r \cos \theta; r \sin \theta) \right| = \frac{|2r \cos \theta \cdot r^4 \sin^4 \theta|}{(r^2)^2}$$

$$= \frac{2r^5}{r^4} \underbrace{|\cos \theta|}_{\leq 1} \times \underbrace{|\sin^4 \theta|}_{\leq 1}$$

$$\leq 2r \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = 0 = \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}$ est continue en $(0,0)$

5) $\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Ex 3 $f(x) = \ln(1+e^x)$

1) $x \mapsto 1+e^x \in C^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in C^\infty(\mathbb{R})$
 $\bullet 1+e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

De plus $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

2) a) $f \in C^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow f$ est 2-fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

De plus on a $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

et $f''(x) = [f'(x)]' = \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2}$

$$= \frac{e^x + e^{2x} - e^{2x}}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$$

$\Rightarrow f''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.

b) f est strictement convexe sur $\mathbb{R} \Rightarrow f$ est convexe sur $\mathbb{R}$. D'où $\forall a, b \in \mathbb{R}$ on a

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$\Rightarrow \ln\left(1+e^{\frac{a+b}{2}}\right) \leq \frac{\ln(1+e^a) + \ln(1+e^b)}{2}$$

$$\Rightarrow \ln\left(1+e^{\frac{a+b}{2}}\right) \leq \frac{\ln[(1+e^a)(1+e^b)]}{2}$$

⑥ $\Rightarrow \ln\left(1+e^{\frac{a+b}{2}}\right) \leq \frac{1}{2} \ln[(1+e^a)(1+e^b)]$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + e^{\frac{a+b}{2}}\right) \leq \ln\left(\sqrt{(1+e^a)(1+e^b)}\right)$$

$$\begin{matrix} x \rightarrow e^x \rightarrow \\ \Rightarrow \end{matrix} \quad 1 + e^{\frac{a+b}{2}} \leq \sqrt{(1+e^a)(1+e^b)}$$

$$3) a) \ln(2+x) = \ln\left(2\left(1+\frac{x}{2}\right)\right) = \ln 2 + \ln\left(1+\frac{x}{2}\right)$$

$$\text{or on sait que } \ln(1+U) = U - \frac{U^2}{2} + o(U^2)$$

$$\frac{x}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \ln\left(1+\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \ln\left(1+\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \ln(2+x) = \ln 2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$b) f(x) = \ln(1+e^x) = \ln(1+e^x - 1 + 1) \\ = \ln(2 + \underbrace{e^x - 1}_{x \rightarrow 0 \rightarrow 0})$$

$$\text{or d'apr\u00e8s 3) a) on a } \ln(2+U) = \ln 2 + \frac{U}{2} - \frac{1}{8}U^2 + o(U^2)$$

$$\text{de plus on sait que } e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \ln 2 + \frac{1}{2}\left(x + \frac{x^2}{2}\right) - \frac{1}{8}\left(x + \frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^2)$$

$$= \ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$= \ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = \ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)}$$

$$c) \text{ d'apr\u00e8s ce qui pr\u00e9c\u00e8de on a } f(x) = \ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow T_0: y = \ln 2 + \frac{x}{2}$$

$$f(x) - y = \frac{x^2}{8} + o(x^2) \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{8} > 0$$

$\Rightarrow f$ est au dessus de T_0 au voisinage de 0.

$$4) a) g(x) = \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{x} = \frac{f(x) - \ln 2}{x}$$

$$\Rightarrow D_g = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

maque $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) < \infty$?

$$\text{D'après 3) b) on a } f(x) - \ln 2 = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{f(x) - \ln 2}{x} \underset{0}{\sim} \frac{\frac{x}{2}}{x} = \frac{\frac{1}{2}x}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < \infty$$

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité en 0

$$h(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$b) D_h = \mathbb{R}.$$

Il est clair que h est dérivable sur $\mathbb{R}^*$
(car $x \mapsto \ln(1+e^x) - \ln 2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
en particulier $\mathbb{R}^*$ et $x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
en particulier $\mathbb{R}^*$ et $x \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$)

Dérivabilité de h en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \ln e}{x} - \frac{1}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2(f(x) - \ln e) - x}{2x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(f(x) - \ln e) - x}{2x^2}$$

$$\text{or } f(x) - \ln e = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow 2(f(x) - \ln e) = x + \frac{x^2}{4} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow 2(f(x) - \ln e) - x = \frac{x^2}{4} + o(x^2) \sim_0 \frac{x^2}{4}$$

$$\text{D'où } \frac{2(f(x) - \ln e) - x}{2x^2} \sim_0 \frac{\frac{x^2}{4}}{2x^2} = \frac{\frac{1}{4}x^2}{2x^2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(f(x) - \ln e) - x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{8} = \frac{1}{8} < \infty$$

$\Rightarrow h$ est dérivable en 0 et $h'(0) = \frac{1}{8}$

D'où h est dérivable sur $\mathbb{R} = D_h$.